

VIRICIDA

Viruseem



Activador natural de defensas de las plantas.

QUÉ HACE

- Formulación de origen botánico diseñado específicamente para la protección de cultivos contra una variedad de virus.
- Utiliza principios activos naturales para fortalecer las defensas innatas de las plantas, creando así un entorno más resistente y saludable para el crecimiento vegetal.
- Ayuda a la activación de defensas naturales, Fomenta la síntesis de metabolitos secundarios en las plantas, mejora y fortalece las barreras físicas de las plantas, los compuestos activos del antiviral interfieren con los procesos de replicación de los virus y ayuda a minimizar los efectos adversos causados por virus en las plantas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Tomate	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del tomate (ToMV), Virus rugoso del tomate (ToBRFV)	
Pimiento	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del pimiento (PeMV), Virus de la cuchara del pimiento (PepMV)	
Papa	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus X de la papa (PVX), Virus Y de la papa (PVY)	
Calabaza	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico de la calabaza (SqMV), Virus del mosaico del pepino (CMV)	
Pepino	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del pepino (CMV), Virus del mosaico amarillo del pepino (CYMV)	
Tabaco	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del tabaco (TMV), Virus del bronceado del tomate (TSWV)	

FICHA FÍSICA

Densidad 0.94–0.96 g/mL

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

VIRICIDA

Viruseem

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Fresa	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico de la fresa (SMV), Virus del anillado necrótico del frambueso (RNRV)	●●●●●
Vid	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del enrollamiento de la hoja de la vid (GLRaV), Virus de la mancha necrótica de la vid (GVB)	●●●●●
Banano	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del estriado del banano (BSV), Virus del mosaico del banano (BMV)	●●●●●
Melón	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del melón (MMV), Virus de la mancha amarilla del melón (MYMV)	●●●●●

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extracto de Echinacea	20 %
Extracto de regaliz	20 %
Extracto de tepezcohuite	20 %
Extracto de Cúrcuma	10 %
Extracto de chilcuague	10 %
Acondicionadores y diluyentes	20 %

CÓMO SE USA

- Siempre agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Aplicación foliar y al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días
Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.